



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



33 01 2001 40 01 00 3

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°24 du 30 août 2000 - 2 pages

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR - FINISTERE - ILLE ET VILAINE

Dans l'ensemble des parcelles, les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux faibles.

En Côtes d'Armor, dans quelques parcelles, les populations de pucerons verts ont légèrement progressé depuis la semaine passée mais elles sont encore loin du seuil de traitement.

De nombreux prédateurs, en particulier les chrysopes et les punaises ainsi que le parasitisme par des champignons entomophthorales sont notés.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

CHOU

PUCERONS- PIERIDES-TEIGNES

COTES D'ARMOR

Quelques colonies de pucerons cendrés, quelques chenilles de piérides ainsi que quelques teignes ont été observés.

Il est encore trop tôt pour intervenir.

FINISTERE

Dans la région de Saint Pol de Léon, les populations de teignes ainsi que des petites colonies de pucerons cendrés, observés dans quelques parcelles, sont en régression depuis la semaine passée.

Surveillez vos parcelles. Dans certains cas, un traitement contre les teignes peut se justifier. Intervenez avec FASTAC à 0,2 l/ha, MASTOR à 0,6 l/ha, DECIS à 0,3 l/ha ou KARATE VERT à 0,15 l/ha. Ces insecticides permettront également de contrôler les populations de pucerons présentes.

ILLE ET VILAINE

Quelques colonies de pucerons cendrés ont été observées.

Dans de nombreuses parcelles, les chenilles de teignes sont toujours présentes mais leurs populations ont légèrement chuté depuis la semaine passée.

Surveillez vos parcelles. En cas de forte présence de teigne, appliquez les préconisations énoncées pour le Finistère.



Prochain
numéro le 6
septembre
2000



Chou :
Surveillez les teignes

733

CULTURES

BIOLOGIQUES

ARTICHAUT

MILDIOU

COTES D'ARMOR-FINISTERE

Des symptômes de mildiou sont toujours observés (tâches visibles sur la face supérieure des feuilles) mais restent souvent limités aux feuilles basses. Quelques rares symptômes sont observés sur capitules.

Surveillez vos parcelles de drageons. Dans les parcelles où des attaques sont observées et avant l'apparition des capitules, réalisez un traitement à base de cuivre (nombreuses spécialités commerciales).

PUCERONS

COTES D'ARMOR-FINISTERE -ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts et de pucerons noirs restent faibles.

La faune auxiliaire est encore présente (punaises prédatrices, chrysopes et coccinelles). On constate également une bonne présence des parasites (champignons entomophthorales et micro-hyménoptères).

Compte tenu des faibles populations de pucerons, il est inutile d'intervenir.

CHOU

PUCERONS- PIERIDES- NOCTUELLES- TEIGNES

COTES D'ARMOR

Les chenilles de teignes sont en diminution. On observe quelques chenilles de piérides sur quelques rares pieds.

Les parcelles observées restent quasiment indemnes de pucerons cendrés.

FINISTERE

Quelques chenilles de teignes et de faibles populations de pucerons cendrés sont observées. Localement, quelques piérides sont observées sur certains plants.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons cendrés sont très faibles. De même, les chenilles de teignes sont très peu nombreuses, mais à surveiller.